

### A. CAMUS

#### APONOGETON NOUVEAU DE L'ANAM

##### A. Eberhardtii A. Camus, n. sp.

Herba valida, 40-60 cm. alta. Tuber sphæroideum vel ovoideum. Folia submersa membranacea, longe petiolata; lamina linear-lanceolata, apice subobtusa, 20-25 cm. longa, 1,5-2 cm. lata, utrinque 2-3 nervis longitudinalibus et multis nervis transversis minus distinctis percursa, margine leviter undulata; petiolus flaccidus, flexuosus, superne leviter dilatatus, 15-20 cm. longus. Pedunculus elongatus, superne crassiusculus, 40-50 cm. longus. Inflorescentia spicis binis dorsiventralibus composita. Spicæ laxifloræ, usque 10-15 cm. longæ. Tepala 2, alba, lata, obovata, rotundata, basi paulo contracta, 2-2,5 mm. longa. Stamina 6; filamenta quam tepala duplo breviora, apice subcontracta; antheræ parvæ. Carpida plerumque 3, quam stamna longiora; ovarium ovoideum in stylum curvatum multo breviorem contractum,. Semina 1-2, oblonga, vel obovato-oblonga, apice rotunda, ecostata, 3-3,5 mm. longa.

ANAM : vallée de la haute rivière de Cu-Bi, prov. Quang tri [Eberhardt, n° 1973].

Par ses épis géminés, dorsiventraux, cette espèce se rapproche des *A. Robinsonii* A. Camus, *spathaceus* E. Meyer, *Holubii* Oliv., *angustifolius* Art., *distachyus* L. f., mais elle est très caractérisée par son inflorescence extrêmement développée, ses 2 tépales, ses étamines plus courtes que les tépales, ses fruits dépassant les tépales et surmontés d'un bec 3-4 fois plus court qu'eux, ses graines droites, non incurvées, très arrondies au sommet, dépourvues de côtes, ses feuilles allongées, développées, homomorphes, toutes submergées (d'après les quelques échantillons que j'ai pu observer).

---

### A. CAMUS

#### ICHNANTHUS NOUVEAU DE L'ASIE MÉRIDIONALE

##### Ichnanthus Harmandii A. Camus, n. sp.

Planta valida, 1,50-2,50 m. alta. Culmi erecti, robusti, teretiusculi, ramosi, plurinodes, glaberrimi. Lamina foliorum elongata, rigida, angustata, linearia, subjuncea, acuminata, 2-4 mm. lata, 60-90 cm. longa, glabra, margine scabriuscula; vagina longa, laxiuscula, striata, superne hirsuta; ligula brevissima, truncata, pilis longis dense ciliata. Panicula ampla, laxa, pyramidalis-ovata, effusa, glabra, 1-1,20 m. alta; axis communis rectiusculus, rigidus, validus, glaber, levis; rami pri-

marii numerosi, elongati, 10-25 cm. longi, angulato-triquetri, scabri, inferne nudi, remoti, infimi fasciculati. Pedicellus clavatus, scaber, 1-3 mm. longus. Spiculae primum lanceolatae, dein apertae, 2,5-3 mm. longae. Gluma inferior chartacea, convexa, patula, ovato-lanceolata, longe acuminata, subaristata, 7-nervia, scaberrula, spiculam aequans. Gluma superior chartacea, convexa, subventricosa, patula, ovato-lanceolata, 7-nervia, glabra, spiculam subaequans. Flos inferior : glumella inferior chartacea, ovato-lanceolata, 7-nervia, spiculam subaequans ; glumella superior ovato-oblonga quam spicula brevior. Flos superior caducus, pedicellatus ; glumella inferior coriacea, pallida, nitida, elliptico-oblonga, glaberima, quam spicula 1/3-1/4 brevior ; glumella superior coriacea, pallida, nitida, elliptico-oblonga, obtusa, margine involuta. Lodiculae 2, parvulae.

SIAM : province de Siemréap [*Harmand*].

COCHINCHINE : [*Pierre*].

Malgré la rudicité des appendices de la fleur supérieure cette espèce se rattache au genre *Ichnanthus* par des caractères importants : la position très nette de la fleur supérieure forment un angle droit avec le reste de l'épillet, la caducité de la fleur supérieure, la persistance des glumes et de la fleur inférieure, la position étalée des glumes à l'état adulte.

Cette espèce se distingue de l'*I. pallens* par ses chaumes rigides, dressés, robustes, ses feuilles étroites, subenroulées, jonciformes, la glume inférieure terminée en arête courte, la glume supérieure plus acuminée.

✓✓  
A. CAMUS

NOTE SUR LES ESPÈCES ASIATIQUES DU GENRE *EREMOCHLOA*

- A. Épillet rudimentaire réduit au pédicelle surmonté d'une glume sétiforme.....,..... 1. *E. Helferi*.
- B. Épillet rudimentaire réduit au pédicelle.
- Ailes de la glume inférieure larges, tronquées-émarginées au sommet.
    - \* Glume inférieure ailée dans la moitié supér., dentée dans la moitié infér., à dents extrêmement courtes ; plante longuement rampante..... 2. *E. ophiurooides*.
    - \*\* Glume inférieure ailée dans le quart supér., dentée dans les 3/4 infér., à dents égalant 1/3-1/2 de la glume ; plante dressée..... 3. *E. muricata*.
  - Ailes de la glume inférieure étroites.
    - \* Glume inférieure obtuse ou obtusiuscule. Pédicelle stérile glabre, acuminé au sommet.